


Årstidsland

Liehattjäjä sameby



Årstidsland

- Värländ
- Sommarland
- Höstland
- Vinterland
- Förlöstland (sensommar)
- Försommarland
- Förvinterland
- Värlvinterland

Fastställt samebygräns

Kalvingsland

Brunstland

Huvudkalvingsland

Areutuntland (Jämtland)

Sameby

Odlingensgräns

Lappmarksgräns

Lappmarks- och Odlingensgräns

Värlvinter (mars-april)

Beröende på snöläge och betestillgång påbörjas flyttningen mot vär- och kalvingsland. Detta sker efter kartans flyttleder. Också vid denna tid är arbetet av stor betydelse. Renen söker sig mot solfåror i sydlutningar och åldavår, där kommer betet att bli gott. Flyttleder och åldavår, där kommer betet att bli gott. Flyttleder och åldavår, där kommer betet att bli gott.

Värländ (april-maj)

Under maj månad sker kalvningen. Vajorna uppökar gynnsamma platser i terrängen. Dessa platser ligger ofta i sydlägen, där det finns li, och barfläckar tidigt tinar fram. Kalvingsländen är vid denna period mycket känslig för yttre störningar.

Försommarland (juni)

Tiden innan mjögen inflyttat sig betar renen i björkskogen samt vid myrmarker och bäckdrag. Där kommer gönskan tidigare än på kalvfallet.

Sommarland/Högsommarland (juni-juli)

Renarna är under denna tid utspridda över olika kalvfällsområden. Under främst juli månad sker ett omfattande arbete då renar samlas till kalvmarkningsgräns. Samlingsarbetet är arbetskrävande och störningskänsligt.

Sensommar (augusti)

Vid denna tid återfinns renen i den låglänta björkskogen och vid myrmarker. Där betar den gris, örter och framför allt svamp.

Höstland (september-oktober)

Under den tid som gått sedan kalvmärkning har renen spridit sig över stora områden. Därför krävs insatser för att samla in renarna till sarslakt. Detta sker i huvudsak i början av september.

Förvinterland / Förjåvinterland (november-december)

Snön och snåra har kommit och grobetet har försvunnit. Renarna samlas för slakt och skilling till mindre vintergrupper. Under denna tid påbörjas flyttningen till vinterland, där är nu som kartans flyttleder används. Detta är ett mödosamt arbete som tar både på ren och renskötare. Lämpliga rasbeten är en förutsättning för att kunna genomföra flyttningen.

Vinterland (januari-mars)

Vinterbetesmarkerna betraktas ofta som renringens "flaskhalsar", dessa områden är känsliga för ingrepp och störningar av olika slag. Även små ingrepp kan få betydande konsekvens. Avgörande för dessa områden är tillgängligheten till sammanhängande lavmarker av tillräcklig storlek som också har god betesvärdhet. För att kunna betä på ett funktionellt sätt delar samebyn upp sig i mindre vintergrupper, vilka rör sig över stora områden.

