

Årstidsland

- Värländ
- Sommarland
- Höstland
- Vinterland
- Förehöstland (sensommar)
- Försommarland
- Förvinterland
- Värvinterland

Fästställe samebygräns

Kalvingsland

Brunatland

Huvudkalvingsland

Arebruntland (Jämtland)

Sameby

Odlingsgränsen

Lappmarksgränsen

Lappmarks- och Odlingsgränsen

Värvinter (mars-april)
Beror på snölag och betestillgång påbörjas flytningen mot vår- och kalvingsland. Detta sker efter kartans flyttleder. Också vid denna tid är rasbeten av stor betydelse. Renen söker sig mot solador i sydväst och åldar, där kommer betarna tidigt. Tjockt snöskikt och lågt skog gör att hangsvete är nödvändigt.

Värländ (april-maj)
Under maj månad sker kalvningen. Vajorna uppsöker gynnsamma platser i terrängen. Dessa platser ligger ofta i sydlagen, där det finns li, och barfläckar tidigt tinar fram. Kalvingsländen är vid denna period mycket känslig för yttre störningar.

Försommarland (juni)
Tiden innan mjöken inflyttat sig betar renen i björkskogen samt vid myrmarker och bäckar. Där kommer grönskan tidigare än på kalvfallet.

Sommarland/Högsommarland (juni-juli)
Renarna är under denna tid utspridda över olika kalvingsområden. Under främst juli månad sker ett omfattande arbete då renar samlas till kalvingsgränsen. Samlingsarbetet är arbetskrävande och störningskänsligt.

Sensommar (augusti)
Vid denna tid återfinns renen i den låglänta björkskogen och vid myrmarker. Där betar den gräs, örter och framför allt svamp.

Höstland (september-oktober)
Under den tid som gått sedan kalvmärkning har renen spridit sig över stora områden. Därför krävs insatser för att samla in renarna till sarslakt. Detta sker i huvudsak i början av september.

Förvinterland / Förläpavinterland (november-december)
Snö och snar har kommit och grösset har försvunnit. Renarna samlas för slakt och skivning till mindre vintergrupper. Under denna tid påbörjas flytningen till vinterlandet, det är nu som kartans flyttleder används. Detta är ett mådosamt arbete som tar både på ren och renskötare. Lämpliga rasbeten är en förutsättning för att kunna genomföra flytningen.

Vinterland (januari-mars)
Vinterbetesmarkerna betraktas ofta som renarnas "flaskhalsar", dessa områden är känsliga för ingrepp och störningar av olika slag. Även små ingrepp kan få betydande konsekvens. Avgörande för dessa områden är tillgängligheten till sammanhängande lavmarker av tillräcklig storlek som också har god betesväx. För att kunna betä på ett funktionellt sätt delar samebyn upp sig i mindre vintergrupper, vilka rör sig över stora områden.

